




肛門&陰道製劑使用須知

➤ 肛門栓劑的使用方法：

1. 用肥皂和清水清潔雙手。
2. 除去栓劑外包裝，將栓劑放入溫水中濕潤。
3. 側身躺下，背部露出，伸直下面的腿，上面的腿像腹部彎曲。用一手將臀部往上拉，露出肛門口。



4. 用食指將栓劑由圓滑的一端塞入肛門約 5 公分。



5. 夾緊臀部，保持臥姿約 15 分鐘，不要站起或走動，以防栓劑有排出的反應。
6. 栓劑變軟無法塞入時，可將栓劑放置冰箱冷藏約 30 分或除去外包裝前置於冷水使其變硬。

➤ 肛門軟膏的使用方法：

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 用藥前先將肛門周圍清洗乾淨。
3. 輕輕指壓及轉動藥膏管後拿出，藥膏即可均勻塗抹於在肛門四周。若藥膏需擦在直腸上，需用特製之送藥器將藥膏送入直腸內。
4. 使用後將長軟管跟藥膏管分開，長軟管用肥皂和溫水洗淨。

➤ 陰道栓劑的使用方法（一）：

【手置入法】

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 打開栓劑外包裝(封套)，將栓劑迅速放入溫水中濕潤。



3. 仰臥彎曲雙腿，輕輕將藥粒用手指推送入陰道深處 3-5 公分即可。



➤ 陰道栓劑的使用方法（二）：

【送藥器置入法】

1. 將栓劑較小的一端放入送藥柱之杯形尾端。
2. 仰臥彎曲雙腿，輕輕的將送藥柱插入陰道，而深度只要能順利插入即可。輕輕的壓送藥柱以使栓劑推送入陰道後，將送藥柱從陰道取出。
3. 每次使用完後，將送藥柱用肥皂及清水充分洗淨，並裝填好送藥柱保存。



➤ 陰道栓劑注意事項：

1. 避免性交或使用保險套，以免再感染。
2. 一般在睡前或醫師指示時間使用。
3. 非醫師指示，懷孕或哺乳婦女請不要使用；若使用後病情惡化或癢、刺激感時，應立即讓醫師知道。
4. 陰道栓劑應防潮，保存在小孩不易拿到及陰涼處。

用藥諮詢電話：08-7665995 （分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！