



Allopurinol (痛酸立克錠®)

❖ 如何使用此藥？

1. 請配合醫師指示服藥，不可隨意改變服用劑量或任意停藥。
2. 建議在飯後服用，以減輕胃腸道刺激。
3. 服藥期間建議每日至少 10~12 杯水份（約 2.5~3 公升）的補充，除非醫師另有其他指示或建議。

➤ 使用此藥時應該注意什麼？

1. 腎衰竭或腎功能不良之病人，本品可能發生蓄積，或產生過敏反應。
2. 長期使用本品，有必要時請配合醫師定期的抽血檢查，以確定療效或副作用的發生。
3. 服藥期間避免大量飲酒，它可能增加尿酸濃度並減低藥物治療效果。
4. 大量服用維生素 C 或氯化銨可能會增加腎結石生成之潛在性，故須特別小心。
5. 此藥並不能減緩痛風之急性發作。請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿放在孩童可以取得的場所。
6. 服用此藥期間如需服用其他其他藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。

➤ 此藥可能引起的副作用及處理方式

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師聯絡。

1. 最常見副作用為急性痛風發作頻率之暫時性增加，若發生此反應可先以低劑量開始治療，再逐漸增加劑量直到所需的療效為止。
2. 當您發生下列症狀時，請與您的醫師聯絡：皮疹、蕁麻疹或搔癢、類流行性感感冒症狀、嗜睡、腹瀉、頭痛、消化不良等。

➤ 如果忘記服藥時，該怎麼辦？

若忘記服藥，則於想起時盡快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於四小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。



➤ **懷孕或哺乳時該怎麼辦？**

本藥可能會傷害您未出生的胎兒，孕婦不建議使用；計劃授乳的婦女，請於開始服藥前告知您的醫師或藥師。

用藥諮詢電話：08-7665995 （分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！