



Colchicine (可樂喜定錠®)

➤ 醫師為何開此藥？

痛風發作及痛風性關節炎之緩解與預防。

➤ 如何使用此藥？

1. 請確實遵照醫師指示服藥，不可因症狀緩解或未經醫師許可而自行停藥或增減藥量。
2. 痛風發作時請盡快服用此藥，通常在 12 小時內疼痛可以減輕，48 至 72 小時內痛風症狀可以解除。若未能及時服用效果較差。

➤ 使用此藥時應該注意什麼？

1. 對本藥過敏者請告知醫師。
2. 大量使用或誤用本藥，可能在數小時內會引起急性中毒症狀，故需嚴守用法、用量規定。
3. 請將本藥連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍，請勿放在孩童可以取得的場所。
4. 服用此藥期間如需服用其他藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
5. 可作適當的輔助療法（如飲食控制、減輕體重、增加液體的攝取、減少酒精飲料的飲用）。

➤ 此藥可能引起的副作用及處理方式

1. 若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師聯絡。
2. 當您發生下列症狀時，請與您的醫師聯絡：發生血液方面異常、肝腎異常、禿頭、全身搔癢、紅疹、發熱、末梢神經炎、黑便、血尿、少尿、下痢、噁心、嘔吐、腹痛等胃腸障礙症狀。

➤ 如果忘記服藥時，該怎麼辦？

若忘記服藥，則於想起時盡快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於四小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。



寶建醫療
社團法人
寶建醫院
PAOCHIEH HOSPITAL

➤ 懷孕或哺乳時該怎麼辦？

若您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師；本藥目前尚無使用於授乳婦女的資料，使用前先詢問您的醫師或藥師。

用藥諮詢電話：08-7665995 （分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！