



Dilantin (癲能停膠囊®)

➤ 醫師為何開此藥？

治療癲癇及神經疼痛。

➤ 如何使用此藥？

1. 請確實遵照醫師指示服藥，不可因症狀緩解或未經醫師指示許可，而自行停藥或增減藥量。
2. 服用本藥時請以開水吞服，建議飯後或與食物一起服用。

➤ 如果忘記服藥時，該怎麼辦？

若忘記服藥，則於想起時盡快服用；如果一天服用超過二次以上，若距離下次服藥時間少於4小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

➤ 可能出現哪些副作用？

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並且立即就醫或通知醫師：

1. 可能發生疲倦、嗜睡、頭痛、腸胃不適、長面皰、齒齦或毛髮增生等。
2. 當您發生下列症狀時，請與您的醫師聯絡：發生發燒、喉嚨痛、皮疹、脫皮或出水泡、眼球持續震顫或視力模糊、動作不協調或發作次數劇增、意識混亂或口齒不清、出血、黃疸、尿液顏色變深等症狀時。

➤ 服用此藥時該注意什麼？

1. 應按時回診，若癲癇發作次數增加或病情惡化，請馬上與您的醫師聯絡。
2. 有肝臟障礙、血液障礙患者最好不要使用，但如不得已必須投與時應慎重使用。
3. 服藥期間應避免使用含酒精性之飲料。若經由管灌餵食，請與管灌飲食至少相隔1小時以上再服用本藥。
4. 服藥期間可能讓您覺得頭暈、動作不協調、視線模糊、複視、困倦，請勿開車或操作危險機械等需要高度警戒之工作，如從事具潛在危險之活動應有人陪同。



5. 孩童服用本藥時，請觀察並紀錄其行為、情緒、注意力、手眼協調、解決問題、思考能力及癲癇發作之情形。
6. 本藥可能影響心跳，竇性心跳緩慢者請勿使用。
7. 本藥可能降低口服避孕藥的效果，請與您的醫師或藥師討論，是否選擇其他避孕方式。
8. 若同時需服用其他藥品（如鈣片、抗憂鬱劑等），請主動告訴您的醫師或藥師。
9. 請將本藥連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍，請勿放在孩童可以取得的場所。

➤ **計畫懷孕、可能懷孕或正在哺乳時，可以服用嗎？**

本藥可能會傷害腹中胎兒，懷孕婦女不建議使用。計劃授乳的婦女，請於開始服藥前告知您的醫師或藥師。

用藥諮詢電話：08-7665995（分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！