

小兒用藥安全

適合小兒口服的劑型

包括：錠劑、膠囊、粉劑、液劑、酏劑、糖漿劑、溶液劑、懸浮劑。

兒童用藥衛教

1. 兒童不是縮小型的大人

- (1)胃部吸收：胃腸蠕動在新生兒及幼兒較慢。
- (2)肝臟代謝：新生兒肝臟功能只有大人的20-40%。
- (3)腎臟排除：新生兒的腎功能約只有大人的30%，1歲左右才達到成年人水準。
- (4)皮膚吸收：嬰幼兒皮膚通透性高，對於外用藥品的吸收較好。

2. 磨粉分包的藥，兒童使用比較方便？

- (1)用大人的藥品磨粉易受污染，藥品安定性差，保存期限較短。
- (2)多種藥品混合研磨容易變質或產生交互作用，分包劑量不精確。
- (3)稍大年紀的兒童可練習吞服或與少量食物併服。

3. 兒童用藥須知

- (1)並非全部藥品都適合磨粉：藥品磨粉較易受污染，安定性變差，保存期限較短，並可能產生交互作用。
- (2)可請醫師開立兒童專用藥品，如：液劑、糖漿劑、溶液劑、懸浮劑。
- (3)磨粉分包之藥品應於當次吃完；以確保藥品品質。

4. 糖漿或懸浮液的使用方式小叮嚀

- (1)未開封使用的糖漿或懸浮液室溫保存即可。
- (2)乾粉懸浮液第一次使用前應依照指示加入冷開水混合均勻，每次給藥前需再次搖勻。給藥時應確保劑量正確。
- (3)開封使用之藥品應依照指示冷藏或室溫保存，注意個別之有效期限。

5. 嬰兒給藥方式

- (1)使用有刻度的吸管或口服注射器。
- (2)抱在膝上，支撐頭部。
- (3)一次只給少量藥品以防噎到。
- (4)藥品滴在口腔的後方或邊緣。
- (5)給藥時要同時安撫嬰兒。

6. 幼兒給藥方式

- (1)由幼兒選擇服藥的姿勢，讓幼兒熟悉量具。
- (2)必要時，用少量食物或飲料掩蓋味道，服藥後喝水或飲料去除味道。
- (3)使用兒語給予簡單的指示或鼓勵，讓他們合作。
- (4)如需服用多種藥品，由幼兒選擇服藥順序。

7. 兒童吐藥

若吃藥後馬上吐掉，則要補服藥品。通常越容易被吸收的，如：糖漿劑、液劑或已磨粉的，超過 10-15 分，則不必補服。錠劑因藥品崩散時間不一而有不同處理，若吐出來的藥仍完整，則需補服；否則，不需補服。

用藥諮詢電話：08-7665995 （分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！