

孕婦用藥安全

懷孕用藥安全級數

孕婦應避免不必要的藥品，儘可能使用食品療法或改變生活形態。

A 級：臨床對照試驗顯示在孕婦是安全的。

B 級：無臨床試驗對照，動物試驗顯示安全或有不良反應，臨床對照試驗沒問題。

C 級：動物試驗顯示有致畸性，但沒有人體對照試驗或臨床試驗資料均缺乏。

D 級：有致畸性，但醫療上【利大於弊】時可以使用。

X 級：孕婦絕對不可使用。

孕婦用藥對胎兒造成影響的決定因素

1. 藥品的致畸胎性、藥品會否與蛋白結合、藥品的代謝方式
2. 用藥時間在懷孕的哪一期
3. 用藥時間長短及劑量
4. 給藥方式
5. 孕婦子宮血流情況
6. 母體代謝能力、體脂肪多寡。

藥物對胚胎的影響

依胚胎發育的情況，可分為：

著床前期	0~2 週	通常不會導致胎兒畸型
胚胎期	3~8 週	關鍵時期，器官形成期，會引起胎兒畸型或成死胎
胎兒期	9~16 週	可能造成兔唇及女性胎兒性器男性化
胎兒期	16 週~生產前	胎兒生長完成，可能造成胎兒生理機能異常

用藥諮詢電話：08-7665995（分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！