

毛地黃（Digoxin）用藥須知衛教指導



❖毛地黃（Digoxin）作用

主要是用來改善心臟收縮強度和心臟的功能或是用來控制心跳速率和節率的藥品，能改善心臟病人者的血液循環以及能夠減少手及腳的腫脹。

❖使用注意事項

- 1.避免食用含高鹽類的食物，例如：食鹽、醃製品、麵線、鹹魚...
- 2.請不要食用大量的甘草，它會造成鹽、水份滯留於體內而產生其他的併發症。
- 3.請定期測量您的脈搏，假使您的脈搏跳動速率是較慢（小於 60 次/分）或較快時（大於 100 次/分），或是脈搏節律或強度改變時，請儘速與您的醫生連絡。
- 4.此藥物劑量會隨著不同的病人而有所不同，所以請遵循醫師給您的劑量按時服用。
- 5.假使您忘了服藥，在 12 小時之內您可服用忘記吃的藥量，但是若時間已接近下次服藥的時間，請勿服用雙倍的劑量來補您錯過的劑量。
- 6.未得到醫師的同意，請勿擅自停藥。
- 7.某些藥物會影響毛地黃的藥效所以到其他醫院就診時，請告知醫師您有服用毛地黃，以作為醫師用藥參考。
- 8.長期使用可能會引起一些副作用，若有以下這些症狀時請儘速與您的醫師連絡。（胃口差、噁心、嘔吐、腹痛、下痢、常感到極度的疲倦及虛弱、視覺模糊、看東西時四周出現黃、綠、白色光圈、嗜睡、瞻妄、情緒低落、頭痛、少數會出現皮膚疹及蕁麻疹。）

參考文獻：

蔡仁貞、梁穎、洪美英、高秋惠、楊易宏、張效煌(2016)・心臟疾病護理・劉雪娥總校閱，成人內外科護理上冊(七版，772 頁)・台北市：華杏。

