

肺結核藥物反應衛教指導



結核藥物有許多種，醫師會依您的身體狀況調整藥物，臨床常見的結核藥物如下，服藥時有任何問題請立即向醫療人員反應，並調整藥物，切勿自行停藥或調整藥物劑量，以免產生抗藥性。

藥物商品名(學名)	作用	可能副作用	備註
Isoniazid(INAH)(異菸鹼酸胺片)	殺菌作用	皮疹、肝指數上升、感覺異常、末梢神經病症。	
Pyrazinamide (PZA)(吡井羧胺錠)	殺菌作用	尿酸升高、噁心嘔吐、關節痛、肝指數上升、血糖升高。	
Rifampicin(RMP)立汎黴素膠囊	殺菌作用	皮疹、腹瀉、噁心、 頭暈頭痛 、肝指數升高、 體液/尿液變橘 寒顫肌肉疼痛(類似流感症狀)	
Ethambutol(Epbutol)(易復癆錠；醫肺妥)	抑菌作用	頭暈、肝指數異常、視力異常(眼球後視神經炎易導致紅綠色盲)	不可與制酸劑(antacids)一起使用
固定成分複方製劑 AKURIT-4 FC TAB(立剋核-4 膜衣錠)	殺菌、抑菌作用	同上藥物 1.2.3.4	
固定成分複方製劑 AKURIT-3 FC TAB(立剋核膜衣錠)	殺菌作用	同上藥物 1.2.3	
固定成分複方製劑 RIFINAH(樂肺寧糖衣錠)	殺菌作用	腹瀉、噁心、頭暈、肝指數上升、尿液變橘色、末梢神經病症、皮疹	
Mycobutin(Rifabutin)淨核膠囊	殺菌作用	皮疹、腹瀉、尿液變成橘色	
RHZ-3(愛兒肺平-3)(兒童專用藥)	殺菌作用	頭暈、尿酸升高、肝指數異常、視力異常、末梢神經病症	藥錠投入約 50cc 飲水中，待其完全溶解攪拌後飲用。
RH(兒立服-2)(兒童專用藥)	殺菌作用		

資料來源：

衛生福利部疾病管制署(2017)・診治指引(六版，52-69頁)・台北市：衛生福利疾病管制署。

