編印單位: DON-4-兒 007 制定日期: 98年02月01日

修訂日期:111年03月17日第8版

溢奶的原因與預防方法衛教指導



❖正常的溢奶現象

又稱為胃食道遲緩症。主因是小寶寶食道末端括約肌發育尚不完 全,無法適時關閉而讓食物溢出體外稱為溢奶,等到小寶寶一週歲 以後發育成熟了症狀會慢慢消失。

◆不正常的溢奶

- 1. 胃食道逆流症: 會呈現噴射狀距離較遠的吐奶。發生時間不一定, 通常需要讓醫師檢查或接受藥物治療。
- 2. 幽門狹窄:較少見。在每次餵奶後即呈噴射狀吐奶。通常幽門處 肌肉較肥厚,易影響生長發育需手術治療。

❖預防方法

- 1. 餵母奶是最好的預防方法,寶寶會控制需要量,較不易吸入空氣。
- 2. 餵奶後勿翻動寶寶身體,如換尿布或和寶寶劇烈的玩耍。
- 3. 餵奶後給予打嗝排氣,最好餵奶後能抱立三十分鐘。
- 4.選擇適當奶洞餵食,打嗝後的溢奶,可能因為奶洞太大或吸入太 多空氣或餵食太多奶量等。
- 5.注意寶寶的尿布或是褲子是否太緊,避免讓寶寶腹部受壓的動作。

❖如何為寶寶排氣

可將寶寶靠於胸前或坐於大腿上,支托寶寶的頭頸部以空心掌拍 背。若寶寶五到十分鐘後仍未打嗝,則睡時將寶寶頭頸部抬高即可 預防吐奶。

❖奶洞大小之評估

將奶瓶倒置,奶水呈滴狀流出,平均一秒鐘一滴奶之流速即可。

參考文獻:

陳怡伶(2011年,2月19日)·新生兒常見問題與處理·取自

http://www.skh.org.tw/fetation/download/%E6%96%B0%E7%94%9F%

E5%85%92%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%88% 87%E8%99%95%E7%90%86.pdf



總機: 08-7665995

|救護專線:08-7330290 院址:屏東市中山路123號 網址:www.paochien.com.tw